

Defesa:20/08/1996

HÁBITOS DE SUCÇÃO E SUAS CORRELAÇÕES COM OCLUSÃO, RESPIRAÇÃO E CECEIO EM POPULAÇÃO DE PRÉ-ESCOLARES

Márcia Oliveira Soligo

Leslie Piccolotto Ferreira (Orientadora)

http://aleph50018.pucsp.br/F/8VF4I217DPGUKNCBPYUCPKLD6RRFHGYB6LVP99ULK8J8TJVAM-51587?func=item-global&doc_library=PSP01&doc_number=000032816&year=&volume=&sub_library=BNGK

O presente trabalho avaliou 164 pré-escolares, de ambos os sexos, da rede particular de ensino de Jundiaí, com o objetivo de pesquisar os hábitos de sucção e suas correlações com a oclusão, a respiração e o ceceo. Concluiu-se que os hábitos de sucção de maior ocorrência são mamadeira e chupeta, sendo que a incidência destes decresce com o decorrer da idade e não depende do sexo. A combinação dos hábitos de sucção e da respiração bucal tem como consequência a mordida aberta antes dos 4 anos. Os hábitos mantidos até 5 anos, associados à respiração nasal e a respiração bucal sem hábitos após 4 anos, não podem ser considerados como etiológicos de mordidas abertas. Não houve relação significativa entre hábitos de sucção e ceceo, e nem entre mordidas abertas e ceceo. Não houve relação significativa entre os hábitos de sucção e mordida cruzada, hábitos de sucção e ceceo e hábitos de sucção e respiração bucal. Não houve relação significativa entre a respiração e a mordida aberta, ou seja, a maior ou menor abertura oclusal no sentido vertical independe do modo respiratório. Não houve relação significativa entre mordida aberta anterior e ceceo nem mesmo na presença de respiração bucal. Questiona-se, frente a esses dados, a relação entre a fonoaudiologia e a odontologia, na prática clínica.