

## **GUILHERME ZARAMELLA DE SOUZA. Voz do ator: condições ambientais e de organização de trabalho.**

**Orientador: Leslie Piccolotto Ferreira.**

**Introdução:** têm aumentado o número de publicações sobre voz profissional, realizados pela Fonoaudiologia. Entretanto, diferentemente de outros profissionais da voz pesquisados, poucos instrumentos são criados para avaliar as condições de produção vocal do ator. **Objetivo:** analisar as condições de ambiente e de organização do trabalho em atores, associadas à referência de sintomas vocais. **Método:** 100 atores com no mínimo dois anos de vivência teatral responderam à uma adaptação do questionário Condição de Produção Vocal do Professor (CPV-P), elaborada por fonoaudiólogos experientes na área de pesquisa e voz, com foco nos principais aspectos do ambiente, organização do trabalho e funcionais da produção vocal do ator. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva e para a análise de associação entre as variáveis independentes ao desfecho "sintomas vocais", foi utilizado o teste do Qui-quadrado, e para alguns desfechos aplicou-se a análise de regressão logística binária múltipla ( $p < 0,05$ ). **Resultados:** dentre os participantes, 56,0% são do sexo masculino, idade média de 30,8 anos ( $dp=8,6$ ), 49% não conseguem se manter financeiramente apenas com a profissão de ator e procuram uma atividade complementar que na maioria das vezes exige também demanda vocal. O principal sintoma vocal apresentado foi o pigarro (68,0%), seguido por garganta seca (54,0%) e voz grossa (45,0%) e houve relação estatística significativa entre ritmo de trabalho estressante e o assédio moral com a voz fraca (respectivamente,  $p=0,030$  e  $p=0,048$ ). Atores sensibilizados com as questões de trabalho que interferem em sua saúde contaram com isso como fator protetor para os sintomas tosse com secreção ( $OR=0,40$ ;  $p=0,044$ ), garganta seca ( $OR=0,42$ ;  $p=0,042$ ) e rouquidão ( $OR=0,30$ ;  $p=0,011$ ). O sintoma falta de ar apareceu com menor incidência em atores que costumam realizar desaquecimento ( $OR=0,19$ ;  $p=0,034$ ) **Conclusão:** poeira e ruído foram os principais fatores ambientais citados, e esforço físico intenso e ritmo estressante dentre os relacionados a organização do trabalho. Os sintomas mais referidos foram pigarro, garganta seca, voz grossa e tosse seca, sendo que o pigarro foi diretamente associado ao ruído.